



**Gramin Krishi Mausam Sewa**  
India Meteorological Department  
ICAR - Central Arid Zone Research Institute  
Jodhpur, Rajasthan



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 05-05-2020

Weather Forecast of JODHPUR(Rajasthan) Issued On : 2020-05-05(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-05-06	3.0	41.0	28.0	39	13	18.0	200	2
2020-05-07	0.0	42.0	27.0	44	9	14.0	230	0
2020-05-08	0.0	43.0	28.0	43	8	20.0	230	1
2020-05-09	0.0	44.0	29.0	41	11	22.0	230	0
2020-05-10	0.0	43.0	28.0	49	12	17.0	230	0

### Weather Summary/Alert:

06 मई को हल्की वर्षा होने की सम्भावना ।

There is a possibility of light rainfall 06 May.

### General Advisory:

For the control of fruit fly attack in muskmelon and watermelon, spray Malathion 50 EC@ 1 ml per liter water.

खरबूजा व तरबूज में फल मक्खी के प्रकोप से फल सड़ने लगते हैं फल मक्खी का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु मैलाथियान 50 ई.सी. 1 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

### SMS Advisory:

For the sowing of B.T. cotton crop, Byoseed-6588, RCH-650, MRCH-6304, RCH-134 varieties of B.T cotton. Recommended seed rates 2 kg per hectare.

बी.टी. कपास की बुवाई हेतु बायोसीड-6588, आर.सी.एच-650, एमआरसीएच-6304, आर.सी.एच-134 किस्में उपयुक्त हैं। बी.टी. की बुवाई के लिए 2 किलो बीज प्रति हेक्टेयर उपयोग में लें।

### Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
BRINJAL	Fruit borer may attack in brinjal crop. To control fruit borer, pickup the affected fruit and buried in the soil. Spray Quinalphos @ 1 ml per liter water. बैंगन की फसल में फल छेदक कीट की लटे फल में छेद कर अन्दर से गुददे को खाती है इसके नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी में दबाएं तथा क्यूनालफास 1 मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

### Others(Soil Testing/Conservation /Land Preparation Specific Advisory:

<b>Others(Soil Testing/Conservation /Land Preparation(Varieties)</b>	<b>Others(Soil Testing/Conservation /Land Preparation Specific Advisory</b>
GENERAL ADVICE	<p>Those farmers who have irrigation facility and plan to grow cumin in coming winter season are advised to collect residue of mustard can be incorporated @ 2.5 t ha-1 in the field to be planted with cumin. At the time of high temperature in May, field should be irrigated in order to decompose residues. This will facilitate release of biotoxic volatiles killing cumin wilt pathogen.</p> <p>जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है एवं आगामी रबी की फसल में जीरा लगाना चाहते हैं तो उस खेत में सरसों की फलकटी 2.5 टन व 0.5 टन सरसों की खली प्रति हेक्टर का भुरकाव करके तवीये निकाल कर एक सिंचाई तेज गर्मी के समय दें ताकि फलकटी व खल के सड़ने से जो गैस निकले उससे उखटा रोग की फंफूद अभी ही खत्म हो जाये। यह कार्य तेज गर्मी के समय पर करना जरूरी है।</p>