



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
Jodhpur, Rajasthan



Agromet Advisory Bulletin

Date : 06-12-2019

Weather Forecast of JODHPUR(Rajasthan) Issued On : 2019-12-06(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2019-12-07	0.0	29.0	13.0	55	19	6.0	50	3
2019-12-08	0.0	28.0	12.0	53	17	6.0	50	0
2019-12-09	0.0	28.0	13.0	51	18	6.0	70	0
2019-12-10	0.0	29.0	13.0	52	19	5.0	70	0
2019-12-11	0.0	29.0	13.0	54	16	5.0	90	1

Weather Summary/Alert:

There is a possibility of clear weather and no rains in coming days.

आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने तथा वर्षा नहीं होने की सम्भावना ।

General Advisory:

Apply light irrigation should be given in cumin at 7-8 days interval for better germination.

जीरे की फसल में अच्छे अंकुरण के लिए 7-8 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहें।

SMS Advisory:

First irrigation should be given in barley crop (25-30 DAS).

जौ की फसल में बुवाई के 25-30 दिन बाद प्रथम सिंचाई करें।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
WHEAT	For weeds control in wheat crop, weeding and hoeing should be done 7-8 day after first irrigation. गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रथम सिंचाई देने के 7-8 दिन बाद निराई गुडाई अवश्य करें।
HORSE GRAM	For the control of grub in gram crop, spray Indoxcarb 14.5 SC @ 1 ml per liter water. चने की फसल में लट के प्रकोप को कम करने के लिए इण्डोक्साकार्ब 14.5 एस.सी. 1 मिली लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ONION	Transplanting of mature seedlings of onion crop should be done, recommended dose of fertilizer for N: P: K is 50, 50 and 100 kg per hectare at the time of last ploughing.
	प्याज की तैयार पौध की रोपाई करें। रोपाई से पूर्व 50 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस एंव 100 किलो पोटेश प्रति हैक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय अन्तिम जुताई के समय दें।

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	Over feeding of berseem and lucerne may cause the bloat in the animal. Therefore, feed these green fodders along with dry fodder.
	बरसीम व रिजका अधिक खिलाने से पशुओं में आफरा हो सकता है अतः पशुओं को हरे चारे के साथ सूखा चारा मिलाकार खिलाएं।