



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 11 फरवरी 2020

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

| मौसमी तत्व / दिनांक | 12/02/20 | 13/02/20 | 14/02/20 | 15/02/20 | 16/02/20 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| वर्षा (मि.मी.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिकतम तापमान (°सेल्सियस) | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस) | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| बादलों की स्थिति (ओक्टा) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह | 61 | 62 | 61 | 64 | 63 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम | 16 | 15 | 15 | 12 | 17 |
| हवा की गति (कि.मी/घंटा) | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| हवा की दिशा | पूर्व- उत्तर- पूर्व | पूर्व- उत्तर- पूर्व | उत्तर- पश्चिम | पूर्व | पूर्व |

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

| फसल | अवस्था | सलाह |
|------------|--------|---|
| गेहूं | | गेहूं की फसल में कांतिक अवस्थाओं जैसे बालियां निकलते समय तथा दाने की दूधिया अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। |
| जौ व गेहूं | | जौ व गेहूं की फसल में दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी 4 लीटर प्रति हैक्टेयर सिंचाई के साथ दें। |
| लहसुन | | लहसुन में थ्रिप्स कीट (पर्ण जीवी कीट) के प्रकोप की सम्भावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसता है जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती है तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकतें पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। |
| भेड़-बकरी | | इस समय भेड़ व बकरी में माता एंव कन्टेजियस एक्थार्डिमा (ORF) की सम्भावना भी अधिक रहती है। यदि भेड़ व बकरी में माता रोग से बचाने के टीके नहीं लगवाएं है तो टीकाकरण करवा लें। |

(नौडल ऑफीसर)