



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 29 मई 2015

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,  
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमीतत्व / दिनांक	29/05/15	30/05/15	31/05/15	01/06/15	02/06/15
वर्षा (मि.मी.)	1	0	0	1	1
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	43	43	42	42	42
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	32	32	31	31	31
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	4	2	2	4	3
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	38	32	30	48	44
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	12	18	14	16	18
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	10	12	10	8	13
हवा की दिशा	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

खेत की मिट्टी का नमूना लेकर नजदीक की प्रयोगशाला में जाँच कराएं जिससे खरीफ सिजन में फसलों की अधिक पदावार लेने के लिए उर्वरकों की सही मात्रा का पता लग सके।

मूंगफली की उन्नत किस्में – आर.जी. 425, आर.जी. 382, एच.एन.जी.10, जी.जी. 20, टी.जी.37-ए, टी.जी. 39, एम. 13

मूंगफली के खेत में अन्तिम जुताई से पूर्व प्रति हैक्टेयर 250 किलो जिप्सम व बुवाई के समय 15 किलो ग्राम नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस ऊर कर दें।

बुवाई से पहले प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थाइरम या 2 ग्राम मैन्कोजेब से उपचारित करें।

कपास में अंकुरण के बाद पहली सिंचाई 20-30 दिन में करें इस से पौधे की जड़ें जादा गहराई तक जाती है। इसी समय पौधों की छंटनी भी करें।

भिण्डी में लाल वरुथी (माइटस) का प्रकोप होने पर नीम के बीजों के 3 प्रतिशत सत्व का छिड़काव करें।

गर्मी के इस मौसम में दूध उत्पादन हेतु दूध देने वाली गाय एवं भेंस को हरे चारे के साथ सन्तुलित आहार खिलाएं तथा स्वच्छ एवं ताजा पानी तीन बार पिलाएं।

(नौडल आफीसर)