



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 03-03-2023

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-03-03 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-03-04	2023-03-05	2023-03-06	2023-03-07	2023-03-08
वर्षा (मिमी)	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	32.0	34.0	34.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	19.0	20.0	19.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	38	38	32	30	27
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	17	18	15	14	11
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	14.0	10.0	13.0	14.0	13.0
पवन दिशा (डिग्री)	49	84	92	83	71
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	4	1	2	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 32.0 से 34.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19.0 से 20.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 32.0 से 34.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19.0 से 20.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

04 और 05 मार्च को कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की सम्भावना है। वर्षा की सम्भावना को देखते हुए कटाई की गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें।

04 और 05 मार्च को कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की सम्भावना है। वर्षा की सम्भावना को देखते हुए कटाई की गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

किसान भाई गेहूं की 110 दिन की फसल में प्रारम्भिक डफ अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें।

किसान भाई गेहूं की 110 दिन की फसल में प्रारम्भिक डफ अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	किसान भाई सरसों की फसल को कटाई के बाद कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद गहाई करें।
चना	समय पर बोयी गयी चने की फसल पकाव अवस्था पर हैं अतः फसल की उचित कायिक अवस्था पर कटाई करें व सुरक्षित स्थान पर रखें।
गेहूँ	जौ और गेहूँ की फसल में दीमक की रोकथाम हेतु क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. 4 लीटर प्रति हेक्टर सिंचाई के साथ दें।
सरसों	किसान भाई सरसों की फसल को कटाई के बाद कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद गहाई करें।
चना	समय पर बोयी गयी चने की फसल पकाव अवस्था पर हैं अतः फसल की उचित कायिक अवस्था पर कटाई करें व सुरक्षित स्थान पर रखें।
गेहूँ	जौ और गेहूँ की फसल में दीमक की रोकथाम हेतु क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. 4 लीटर प्रति हेक्टर सिंचाई के साथ दें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिडकाव करें।
खरबूजा	खरबूजा की फसल के लिए पूसा शर्बती, आर.एम-50, आर.एम-43 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बीज को 3 ग्राम कार्बेन्डाजिम से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।
प्याज	प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिडकाव करें।
खरबूजा	खरबूजा की फसल के लिए पूसा शर्बती, आर.एम-50, आर.एम-43 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बीज को 3 ग्राम कार्बेन्डाजिम से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं में इस महीने में खुरपका एवं मुंहपका रोग के टीके लगवाएं ताकि आने वाले समय में रोग से पशुओं का बचाव हो सके।
गाय	पशुओं में इस महीने में खुरपका एवं मुंहपका रोग के टीके लगवाएं ताकि आने वाले समय में रोग से पशुओं का बचाव हो सके।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	वर्तमान मौसम कुष्माण्ड कुल की फसलों बुवाई के लिए उपयुक्त है। अतः किसान ककड़ी, करेला और लौकी आदि की बुवाई शुरू करें।
सामान्य सलाह	शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक तापमान के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए फसलों, सब्जियों व फलदार पौधों में मुरझान बिंदु दिखाई देने पर अतिरिक्त सिंचाई करें।
सामान्य सलाह	वर्तमान मौसम कुष्माण्ड कुल की फसलों बुवाई के लिए उपयुक्त है। अतः किसान ककड़ी, करेला और लौकी आदि की बुवाई शुरू करें।
सामान्य सलाह	शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक तापमान के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए फसलों, सब्जियों व फलदार पौधों में मुरझान बिंदु दिखाई देने पर अतिरिक्त सिंचाई करें।