



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 26 दिसम्बर 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

| मौसमी तत्व / दिनांक | 27/12/17 | 28/12/17 | 29/12/17 | 30/12/17 | 31/12/17 |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| वर्षा (मि.मी.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिकतम तापमान (°सेल्सियस) | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 |
| न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| बादलों की स्थिति (ओक्टा) | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह | 84 | 86 | 82 | 80 | 78 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम | 30 | 31 | 30 | 28 | 29 |
| हवा की गति (कि.मी/घंटा) | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 |
| हवा की दिशा | दक्षिण- पूर्व | पूर्व- उत्तर- पूर्व | उत्तर- उत्तर- पूर्व | उत्तर- उत्तर- पूर्व | उत्तर- पूर्व |

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

| फसल | अवस्था | सलाह |
|-------|-----------|---|
| चना | | मौसम शुष्क रहने की सम्भावना को देखते हुए चने की फसल में सिंचाई करें। |
| सरसों | पुष्पन | सरसों की फसल में फूल आने की अवस्था पर सिंचाई करें। सफेद रोली रोग के नियंत्रण हेतु मेटालेक्जिल 8 प्रतिशत व मेन्कोजेब की 2.5 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। |
| मैथी | वानस्पतिक | मैथी की फसल में बुवाई के 50 दिन बाद वानस्पतिक अवस्था पर सिंचाई करें। |
| पशु | | तापमान कम होने के कारण पशुओं को सर्दी से बचाएं तथा रात में पशुओं को गर्म स्थान जैसे की छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांधें। |

(नौडल ऑफीसर)